

**Prevodník násad rýb na prepočítavanie  
vekových kategórií násad rýb pri zarybňovaní rybárskych revírov**

| DRUH RYBY           |                                      | Kategória                 | PREPOČÍTAVACIE KOEFICIENTY   |
|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|--|
| Slovenský názov     | Latinský názov                       | Označenie                 |  |
| Kapor rybníčný      | <i>Cyprinus carpio</i>               | <b>K<sub>2,3</sub></b>    | 1 ks <b>K<sub>2,3</sub></b> = 15 ks <b>K<sub>1</sub></b> , (1 ks <b>K<sub>1</sub></b> = 15 ks <b>K<sub>r</sub></b> = 25 ks <b>K<sub>o</sub></b> )                |
| Lieň sliznatý       | <i>Tinca tinca</i>                   | <b>L<sub>2,1</sub></b>    | 1 ks <b>L<sub>2</sub></b> = 15 ks <b>L<sub>1</sub></b>   |
| Pleskáč vysoký      | <i>Abramis brama</i>                 | <b>Pv<sub>2</sub></b>     | 1 ks <b>Pv<sub>2</sub></b> = 15 ks <b>Pv<sub>1</sub></b>   |
| Amur biely          | <i>Ctenopharyngodon idella</i>       | <b>A<sub>1</sub></b>      | 1 ks <b>A<sub>1</sub></b> = 100 ks vreckového plôdika  |
| Tolstolobik biely   | <i>Hypophthalmichthys molitrix</i>   | <b>Tb<sub>1</sub></b>     | 1 ks <b>Tb<sub>1</sub></b> = 3 ks do 6 cm  |
| Tolstolobik pestrý  | <i>Hypophthalmichthys nobilis</i>    | <b>Tp<sub>1</sub></b>     | 1 ks <b>Tp<sub>1</sub></b> = 1 ks nad 6 cm   |
| Karas striebřistý   | <i>Carassius auratus</i>             | <b>Ka<sub>2</sub></b>     | 1 ks <b>Ka<sub>2</sub></b> = 15 ks <b>Ka<sub>1</sub></b>   |
| Štuka severná       | <i>Esox lucius</i>                   | <b>Š<sub>1</sub></b>      | 1 ks <b>Š<sub>1</sub></b> = 5 ks <b>Š<sub>r</sub></b> (do 5 cm) = 2 ks <b>Š<sub>r</sub></b> (do 10 cm) = 200 ks <b>Š<sub>o</sub></b>                             |
| Štuka severná       | <i>Esox lucius</i>                   | <b>Š<sub>&gt;1</sub></b>  | 1 ks <b>Š<sub>&gt;1</sub></b> (do 40 cm) = 3 ks <b>Š<sub>1</sub></b> , 1 ks <b>Š<sub>&gt;1</sub></b> (nad 40 cm) = 4 ks <b>Š<sub>1</sub></b>                     |
| Zubáč veľkoústý     | <i>Sander lucioperca</i>             | <b>Zu<sub>1</sub></b>     | 1 ks <b>Zu<sub>1</sub></b> = 5 ks <b>Zu<sub>r</sub></b> (do 6 cm) = 2 ks <b>Zu<sub>r</sub></b> (do 10 cm) = 200 ks <b>Zu<sub>1</sub></b> a <b>Zu<sub>o</sub></b> |
| Zubáč veľkoústý     | <i>Sander lucioperca</i>             | <b>Zu<sub>&gt;1</sub></b> | 1 ks <b>Zu<sub>&gt;1</sub></b> (do 30 cm) = 3 ks <b>Zu<sub>1</sub></b> , 1 ks <b>Zu<sub>&gt;1</sub></b> (nad 30 cm) = 4 ks <b>Zu<sub>1</sub></b>                 |
| Sumec veľký         | <i>Silurus glanis</i>                | <b>Su<sub>1</sub></b>     | 1 ks <b>Su<sub>1</sub></b> = 2 ks <b>Su<sub>r</sub></b> (do 10 cm) = 0,25 ks <b>Su<sub>2</sub></b>   |
| Úhor európsky       | <i>Anguilla anguilla</i>             | <b>Ú<sub>m</sub></b>      | 1 ks násady (do xy cm) = 10 ks monté (do xy cm)  |
| Hlavátka podunajská | <i>Hucho hucho</i>                   | <b>H<sub>1</sub></b>      | 1 ks rôčka = 15 ks rýchlého plôdika do 3 cm  |
| Pstruh potočný      | <i>Salmo trutta m. fario</i>         | <b>Pp<sub>1</sub></b>     | 1 ks rôčka = 5 ks rýchlého plôdika do 5 cm   |
| Pstruh dúhový       | <i>Oncorhynchus mykiss</i>           | <b>Pd<sub>1</sub></b>     | 1 ks rôčka = 2 ks polrôčka   |
| Sivoň potočný       | <i>Salvalinus fontinalis</i>         | <b>Si<sub>1</sub></b>     | 1 ks rôčka = 0,3 ks dvojrôčka  |
| Lipeň tymiánový     | <i>Thymallus thymallus</i>           | <b>Li<sub>1</sub></b>     |  |
| Podustva severná    | <i>Chondrostoma nasus</i>            | <b>Pds<sub>2</sub></b>    | 1 ks dvojrôčka = 2 ks rôčka = 200 ks vreckového plôdika  |
| Nosál sťahovavý     | <i>Vimba vimba</i>                   | <b>No<sub>2</sub></b>     | 1 ks dvojrôčka = 6 ks rôčka do 6 cm  |
| Boleň dravý         | <i>Leuciscus aspius</i>              | <b>Bo<sub>1</sub></b>     | 1 ks rôčka = 1 ks nad 6 cm = 3 ks do 6 cm  |
| Mrena severná       | <i>Barbus barbus</i>                 | <b>Ms<sub>1</sub></b>     | 1 ks <b>Ms<sub>1</sub></b> = 100 ks vreckového plôdika   |
| Jalec hlavatý       | <i>Leuciscus (Squalius) cephalus</i> | <b>Jh<sub>1</sub></b>     | 1 ks <b>Jh<sub>1</sub></b> = 0,5 ks dvojročnej násady  |
| Mieň sladkovodný    | <i>Lotta lotta</i>                   | <b>M<sub>1</sub></b>      | 1 ks <b>M<sub>1</sub></b> = 1000 ks vreckového plôdika <b>M<sub>o</sub></b>  |

**Legenda:** V treťom stĺpci veľké písmená abecedy znamenajú začiatkové písmeno slovenského názvu rýb a malé číslo (dolný index) vyjadruje ich vek, resp. počet prežitých vegetačných období, napr.  $K_1$ ,  $K_2$  (kapor jednorročný, kapor dvojročný),  $\mathring{S}_1$  (štika jednorročná),  $L_2$  (lieň dvojročný) a pod. Ak existuje viac druhov s rovnakým rodovým menom, napr. pstruh potočný a pstruh dúhový, pre označenie sa použije prvé veľké písmeno z rodového názvu a za ním hneď prvé malé písmeno z druhového názvu doplnené o číslo v dolnom indexe ( $Pp_1$  – pstruh potočný jednorročný,  $Pd_2$  – pstruh dúhový dvojročný). V prípadoch, keď sa rodové názvy začínajú na rovnaké písmeno – napr. lieň a lipeň, alebo ak by išlo o grafologické spodobovanie pri označovaní – napr. štika a sumec – na označovanie rýb sa použijú prvé dve písmena z rodového názvu, pričom prvé je veľké a druhé malé, doplnené o číslo v dolnom indexe (napr.  $Li_1$  – lipeň jednorročný,  $Su_2$  – sumec dvojročný a pod.). U rýb, ktoré neprežili ani jedno vegetačné obdobie, sa uvádza nasledujúce označenie:  $Zu_i$  – ikry zubáča,  $\mathring{S}_0$  – vreckový plôdik šťuky,  $Pd_K$  – odkrmený plôdik pstruha dúhového,  $K_r$  – rýchlenný plôdik kapra a pod. Pri jednorročných kategóriách lososovitých, lipňovitých, sihovitých a dravých druhov rýb sa používa výraz rôčik (ročiak), a nie plôdik, ktorý sa používa pri ostatných druhoch rýb.